


BRASMAX ELITE IPRO


5855RSF IPRO

ÓTIMA ADAPTAÇÃO NOS AMBIENTES DE MAIOR ALTITUDE


INTACTA RR2 PRO*



GRUPO DE MATURAÇÃO **5.5**



EXIGÊNCIA A FERTILIDADE



*Não semear em áreas compactadas e sem palhada.

PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo com precocidade
- Maior potencial produtivo que BRASMAX Apolo RR
- Excelente comportamento em relação à Phytophthora (gene RPS1K)
- Ótima adaptação nos ambientes de maior altitude
- Tecnologia Intacta RR2 PRO®

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS



Cancro da haste¹

RESISTENTE



Mancha olho-de-rã

SUSCETÍVEL



Pústula bacteriana

SUSCETÍVEL



Podridão radicular de Phytophthora²

RESISTENTE

¹ Meridionalis ² Gene RPS1K

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

Macrorregião Sojícola **1**

103 e 104.

Macrorregião Sojícola **2**

201 (Indicada somente para Oeste do PR, na semeadura a partir de 15/10, em ambientes com mais de 500m de altitude).

ÉPOCA DE SEMEADURA

MICRORREGIÕES	SET			OUT				NOV				DEZ		POPULAÇÃO (plantas/ha)				
	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20		25	30-01	05	10
103/104																		200-250 mil plantas finais
201 (↑ de 500m)																		250-300 mil plantas finais

Preferencial ■ Tolerada ■

*Sintomas de fitotoxicidade, caracterizados por folha carijó, foram observados em tratamentos contendo tebuconazol e protriocanazol. Esse tipo de sintoma de fitotoxicidade pode estar associado à aplicações em condições climáticas adversas (especialmente estresse hídrico). Deve-se seguir sempre a recomendação do fabricante quanto à utilização de fungicidas. FONTE CT93 EMBRAPA. | Para área de refúgio recomenda-se plantar BRASMAX Ativa RR.